

# ANTHELBEN S

ALBENDAZOLE



## COMPOSITION

Albendazole micronisé.....2 g - Excipient q.s.p. .... 100 mL

## INDICATIONS

A la dose recommandée, le profil d'activité d'ANTHELBEN S s'étend :

- Aux larves et aux adultes des strongles digestifs et strongles respiratoires.
- Aux segments et scolex des cestodes (ténia).

ANTHELBEN S est hautement efficace dans le contrôle de la fasciolose due aux douves adultes (*Fasciola hepatica*).

- ANTHEL BEN S est ovicide.

## POSOLOGIE

Administration par voie orale. Agiter avant l'emploi.

- Ovins et caprins :

- 35 mg d'albendazole/10 kg de poids vif équivalent à 1,75 mL d'ANTHELBEN S/10 kg de P.V (strongles gastro-intestinaux, dictyocaulus, moniezia). En moyenne 2 mL d'ANTHELBEN S pour 10 kg de P.V.

- 50 mg d'albendazole/10 kg de P.V équivalent à 2,5 mL d'ANTHELBEN S /10 kg de P.V (Protostrongylus, *Fasciola hepatica* adulte).

- Bovins :

4 mL d'ANTHELBEN S pour 10 kg de P.V (Strongyloses digestives et respiratoires, fascioloses et moniezioses).

## DÉLAI D'ATTENTE

- Viande et abats :

Ovins et caprins : 10 jours \_ Bovins : 14 jours

- Lait : ne pas administrer aux femelles en lactation dont le lait et ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.

## CONDITIONNEMENT

- Flacon de 100 mL. • Flacon de 1 L. • Bidon de 5 L.