


BOVIGASTRYL



COMPOSITION

Acide propionique (s.f. sel de calcium).....	50 g	Gluconate de cobalte.....	40 mg
DL-Méthionine.....	5 g	Pyridoxine (chlorhydrate) de vit B6 ...	40 mg
Gentiane.....	10 g	Expipient q.s.p.	125 g

INDICATIONS

- Troubles gastriques et métaboliques chez les bovins, ovins et caprins.
- Atonie et surcharge du rumen.
- Troubles digestifs lors de changement de régime et lors du sevrage.
- Intoxication par l'ammoniac.
- Complément du traitement des réticulites traumatiques, traitement adjuvant des troubles métaboliques : états hypoglycémiques, cétoses, toxémie de gestation.

POSOLOGIE

Administration par voie orale à la bouteille ou au pistolet doseur après mise en suspension dans 1/2 à 1 litre d'eau.

Traitement curatif :

- Bovins adultes: 1 sachet 2 fois/jour à 12 heures d'intervalle.
- Jeunes bovins: 1/2 sachet une à deux fois/jour.
- Ovins et caprins: 1/4 de sachet/jour.

Traitement préventif :

- Bovins adultes: 1/2 sachet/jour pendant 2 à 3 jours .
- Jeunes bovins: 1/4 de sachet/jour pendant 2 à 3 jours.

DÉLAI D'ATTENTE

- Nul.

CONDITIONNEMENT

- Sachets 125 g.