

COCCIPROL

AMPROLIUM



COMPOSITION

Amprolium Chlorhydrate..... 20 g
Excipient q.s.p. 100 g

INDICATIONS

Utilisé principalement chez les volailles et chez les ruminants à titre curatif ou préventif.

- Chez les volailles : coccidiose cecale et coccidioses intestinales.
- Chez les bovins et ovins : diverses coccidioses, en particulier la coccidiose colorectale des bovins.

POSOLOGIE

- Chez les volailles : administration par voie orale après dissolution dans l'eau de boisson.

Traitement	Durée	Posologie
Attaque normale	5 à 7 jours	120 g/200 litres d'eau/jour
Attaque forte	5 à 7 jours	120 g/100 litres d'eau/jour
Entretien (suite au traitement d'attaque)	1 à 2 semaines	120 g/400 litres d'eau/jour

- Chez les bovins et les ovins : administration par voie orale en mélange à l'eau de boisson à raison de 30 g/2 litres d'eau de boisson/600kg de PV/jour durant 5 jours.
Dans les cas graves doubler la dose.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats : 14 jours.
- Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la consommation humaine.
- Lait : ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait et ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONNEMENT

- Une boîte de 10 sachet de 30 g.
- Un sachet de 120 g.