

# COCCIVIT

**SULFADIMÉTHOXINE - SULFADIMIDINE - DIAVÉRIDINE**



## COMPOSITION

Sulfadimidine sodique.....	20 g
Sulfadiméthoxine sodique.....	2 g
Diavéridine.....	3 g
Nicotinamide (vitamine PP).....	3 g
Ménadione vitamine K3 .....	2 g
Excipient q.s.p. ....	100 g

## INDICATIONS

Traitement curatif et préventif des coccidioses chez les volailles (poulets, reproducteurs, dindes, pintades et gibiers...)

## POSOLOGIE

- Traitement curatif : à raison de 1g de COCCIVIT/litre d'eau/jour.
- Traitement préventif :

1 <sup>er</sup> Jour	2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> jours	4 <sup>ème</sup> , 5 <sup>ème</sup> , 6 <sup>ème</sup> et 7 <sup>ème</sup> jours
1 g/1 litre d'eau/jour	1 g/2 litres d'eau/jour	1 g/4 litres d'eau/jour

Durée du traitement : 3 à 5 jours.

## DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats : 15 jours.
- Oeufs : utilisation interdite chez les pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

## CONDITIONNEMENT

- Sachet de 100 g.