COLI-5

COLISTINE SULFATE

COMPOSITION

Colistine Sulfate ..... 5000 MUI
Alcool Benzylique ..... 10, 00 g
Excipient q.s.p. ..... 1 L

INDICATIONS

Volailles, Veaux, Agneaux & Porcs : Affections à germes sensibles à la colistine.

POSOLOGIE

Voie orale, après dilution dans l'eau de boisson :
Poulets et dindes : 75 000 UI de Colistine par Kg de poids vif par jour pendant 3 à 5 jours consécutifs dans l'eau de boisson, équivalent à 15 mL de solution à diluer par tonne de poidsvif par jour pendant 3 à 5 jours.

Veaux, agneaux et porcins : 100 000 UI de Colistine par Kg de poids vif par jour pendant 3 à 5 jours consécutifs dans l'eau de boisson ou le lait (substitutif) chez les veaux, équivalent à 0,2 mL de solution à diluer par 10 Kg de poids vif par jour pendant 3 à 5 jours.
La dose quotidienne recommandée doit être divisée en deux en cas d'administration buccale directe du produit à l'animal.
Avant de procéder à l'administration orale, le produit doit être dilué avec un volume d'eau de boisson équivalent à 2,5 par le volume de produit concentré à administrer.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viande et abats : 1 jour
- Oeufs : 0 jour

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 100mL.
- Flacon de 1L.