

CYDOX 500

DOXYCYCLINE



COMPOSITION

Doxycycline (hyclate).....	50 g
Acide ascorbique (vitamine C).....	8 g
Acide tartrique.....	20 g
Excipient q.s.p.	100 g

INDICATIONS

Prévention et traitement des infections à germes sensibles, et notamment les infections respiratoires, digestives, urinaires et les septicémies, chez les poulets, les dindons, les palmipèdes, les veaux et les porcs.

POSOLOGIE

Administration par voie orale après dissolution dans l'eau de boisson ou l'aliment. La posologie de base chez les espèces cibles est de 10 mg de doxycycline/kg de PV/j.

• Chez le veau et le porc :

0,2 g de CYDOX 500/10 kg de PV/j.

• Chez les volailles :

Age < 2 semaines : 20 g de CYDOX 500 / 200 litres d'eau (0,1 g/l)/j.

Age < 2 semaines : 40 g de CYDOX 500 / 200 litres d'eau (0,2g/l) /j.

Durée de traitement : 3 à 5 jours consécutifs.

DÉLAI D'ATTENTE

- Veaux : 14 jours.
- Porcs : 6 jours.
- Volailles : 7 jours.
- Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONNEMENT

- Sachet 100 g.