EQUIMECTYL

IVERMECTINE

COMPOSITION

Ivermectine .....1,87 g
Dioxyde de titane ..... 2 g
Excipient q.s.p. ..... 100 g

INDICATIONS

Chez les équins : traitement et contrôle des maladies parasitaires dues à des parasites sensibles à l'ivermectine : strongyloses gastro-intestinales (grands et petits strongles) dues aux stades adultes et larvaires y compris les stades larvaires à localisation extra-intestinales, ascaridioses, oxyuroses, habronémoses gastriques, gastérophiloses, onchocercoses, et strongyloses pulmonaires à *Dictyocaulus arnfieldi* (stades adultes et larvaires).

POSOLOGIE

Administration par voie orale.
0,2 mg/kg d'ivermectine ce qui correspond à 1,07 g de pâte orale pour 100 kg de P.V
Après une bonne contention, placer l'embout de la seringue à l'arrière de la langue de l'animal et pousser le piston lentement. Chaque graduation sur ce piston correspond à la dose nécessaire pour 100 kg de P.V.
Fixer dès le départ l'écrou à la dose exacte à administrer.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats (Chevaux de boucherie) : 14 jours.

CONDITIONNEMENT

- Seringue de 6,42 g.