

GENTAMED

GENTAMICINE



COMPOSITION

Gentamicine (s.f sulfate)	4.00 MUI
PHBM	130.00 mg
PHBP	20.00 mg
Excipient q.s.p.	100.00 mL

INDICATIONS

- Infections à germes sensibles à la gentamicine :
- Chez les veaux : infections entériques et septicémiques.
 - Chez les chiens et les chats : infections urinaires.
 - Interdiction d'usage chez les volailles.

POSOLOGIE

Voie intramusculaire ou intraveineuse lente.

- Veaux : 3000 UI de gentamicine par Kg de P.V toutes les 8 heures, pendant 3 jours, soit 7,5 mL de solution injectable pour 100 Kg de P.V toutes les 8 heures pendant 3 jours.
- Chiens et chats : 8000 UI de gentamicine par Kg de poids corporel toutes les 8 heures pendant 3 jours, soit 2 mL de solution injectable pour 10 Kg de poids corporel toutes les 8 heures pendant 3 jours.

DÉLAI D'ATTENTE

Bovins :

- Viande et abats : 60 jours
- Lait : ne pas utiliser chez les femelles productrices de lait de consommation, en lactation ou en période de tarissement ni chez les futures productrices de lait de consommation dans les 2 mois qui précèdent la mise-bas.

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 100 mL