

LEVAZOLE 20%

Lévamisole HCl



**Les poules ne font pas que des œufs,
Déparasitez les !**



LEVAZOLE 20%

COMPOSITION

Lévamisole (s. f. chlorhydrate)..... 20 g
Excipient q.s.p. 100 g



ESPÈCES CIBLES

Volailles et porcins

INDICATIONS

Traitement des infestations parasitaires

Chez les volailles : *Ascaridia spp*, *Hétérakis spp*, *Capilaria spp*, *Amidostomum anseris* (oie).

Chez les porcins : Nématodes gastro-intestinaux :
Ascaris suum, *Strongyloïdes ransomi*, *Oesophagostomum spp*

Strongles pulmonaires : *Metastrongylus spp*.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Administration par voie orale.

Chez les volailles : 20 mg de lévamisole par kg de poids vif, soit environ 1,18 g de poudre par litre d'eau de boisson.

Chez les porcins : 7,5 mg de lévamisole par kg de poids vif, en administration unique par voie orale sans dépasser la dose totale par animal de 0,75 g, soit 0,44 g de poudre pour 10 kg de poids vif diluée dans l'eau de boisson ou la soupe sans dépasser la dose de 4,42 g par animal.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser dans le cas où l'on suspecte une résistance au lévamisole.

TEMPS D'ATTENTE

- **Viande et abats :** Volailles : 3 jours - Porcins : 3 jours.
- **œufs :** ne pas utiliser chez les espèces productrices d'œufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci.

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine : 2 ans.
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : à utiliser immédiatement.

CONDITIONNEMENT

Sachet de 100 g

