

MEDEXA 200

DEXAMÉTHASONE

ANTI-
INFLAMMATOIRE



COMPOSITION

Dexaméthasone
phosphate sodique 200 mg*
PHBM Na 110 mg
PHBP Na 20 mg
Excipient q.s.p. 100 mL
* équivalent à 152 mg Dexaméthasone base.

INDICATIONS

Chez les équins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats :

- Corticothérapie.
- Syndromes inflammatoires.
- Syndromes nutritionnels (acétonémie, toxémie de gestation).
- Allergie.
- Choc.
- Induction de la parturition chez les ruminants, à condition que le foetus soit vivant :
 - Brebis : le 144^{ème} jour ou le 145^{ème} jour de gestation, réponse dans les 40 heures suivantes.
 - Vaches : à terme, la rétention placentaire est fréquente.

POSOLOGIE

Administration par voie intra-veineuse, intra-musculaire, sous-cutanée, intra et péri-articulaire.

- Equins, bovins, ovins, caprins et porcins : 0,06 mg/kg, soit 3 mL/100kg.
- Chiens et chats : 0,1 mg/kg soit 0,5 mL/10kg.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats : 6 jours.
- Lait : 6 traites.

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 100 mL.