

NEOVITACYL

OXYTÉTRACYCLINE - NÉOMYCINE - VITAMINES



COMPOSITION

Oxytétracycline (Chlorhydrate)	5 g	Vitamine B12	0,2 mg
Néomycine sulfate	5 g	Vitamine PP	1200 mg
Vitamine A	1 000 000 U.I.	Vitamine B5	400 mg
Vitamine D3	100 000 U.I.	Vitamine K3	72 mg
Vitamine E	60 U.I.	Excipient q.s.p.	100 g
Vitamine B2	250 mg		

INDICATIONS

Traitement des infections à germes à Gram positif et à Gram Négatif sensibles à l'association de l'oxytétracycline et de la néomycine.

- Chez les volailles : entérites infectieuses, typhoses, pullorose, omphalites infectieuses, complications bactériennes de maladies virales et autres infections à germes sensibles.
- Chez les veaux, agneaux, chevreux et porcins : gastro-entérites infectieuses, complications bactériennes de maladies virales et autres infections à germes sensibles.

POSOLOGIE

Administration par voie orale après dissolution dans l'eau de boisson ou après mélange aux aliments de la journée.

- Volailles : 0,4 g par kg de P.V par jour
 - Autres espèces : 0,4 g par kg de P.V à répartir en 2 prises.
- Durée du traitement : 3 à 5 jours consécutifs.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats : 14 jours.
- Œufs : nul.

CONDITIONNEMENT

- Sachet 100 g.
- Sachet de 500.