

# PRAZIMEC

## IVERMECTINE - PRAZIQUANTEL



**PÂTE  
ORALE**



### COMPOSITION

Ivermectine .....	1.55 g	Praziquantel .....	7.75 g
Dioxyde de titane (E171) .....	2.00 g	Jaune orangé S (E110) .....	0.040 g
		Excipient q.s.p. ....	100.00 g

### INDICATIONS

Chez les chevaux : Traitement des infestations mixtes par les cestodes, nématodes et arthropodes. Les parasites suivants du cheval sont sensibles à l'action antiparasitaire de Prazimec :

- Ténias adultes
- Grands strongles
- Petits strongles ou cyathostomes adultes et immatures (larves intraluminales du 4<sup>ème</sup> stade), y compris les souches résistantes aux benzimidazoles, trichostrongles adultes, oxyures (adultes et larves du 4<sup>ème</sup> stade)
- Vers ronds (ascaridés) adultes et larves du 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> stades
- Microfilaires de l'onchocercose du ligament cervical
- Stongyloides (adultes)
- Habronemes (adultes)
- Oestres, stades oral et gastrique
- Strongles respiratoires adultes et larves inhibées du 4<sup>ème</sup> stade

### POSOLOGIE

La dose conseillée est de 200 µg d'ivermectine par Kilogramme de poids vif et 1mg de Praziquantel par Kilogramme de poids vif, ce qui correspond à 1,29 g de Pâte pour 100 kg de poids vif en administration unique, par voie orale.

Le poids et la dose doivent être précisément déterminés avant le traitement. Le contenu d'un applicateur permet de traiter des chevaux pesant jusqu'à 600 Kg ; chaque graduation sur le piston de l'applicateur correspond au traitement de 100 Kg de poids vif.

- Voie et fréquence d'administration : Administration unique par voie orale.

### DÉLAI D'ATTENTE

- Viande et abats : 30 jours.

### CONDITIONNEMENT

- Seringue de 7,74 g.